保护地茄子嫁接栽培生产技术规程

林秀渠, 黄先成, 任利鹏, 魏晓明, 李春龙

(山东省文登市农业局, 264400)

摘要: 嫁接栽培技术可以提高茄子品种抵御外界不良环境和病虫害的能力, 从而达到增加产量和改善品质的目的。通过制定保护地茄子嫁接栽培技术规程, 可有效提高文登市茄子标准化生产的水平。

关键词: 茄子; 嫁接; 技术规程

为提高保护地茄子嫁接技术水平, 进一步促进文登市标准化生产的发展, 现制定保护地茄子嫁接栽培技术规程, 以供参考。

1 嫁接育苗

1.1 选择接穗品种, 培育壮苗

1.1.1 品种选择

选择适合文登市大棚栽培、产量高、品质好的茄子品种作接穗, 如布利塔、大龙等。

1.1.2 种子处理

1.1.2.1 晒种 选择晴天晒种3~4 d, 以促进种子后熟, 增强发芽势, 提高发芽率。

1.1.2.2 药剂处理 用1%甲醛或10%磷酸三钠水溶液擦洗种子并浸泡15~20 min, 然后用温水将种子洗净。

1.1.2.3 温汤浸种 药液浸种后, 随即用50~55℃的温水浸种15 min并不断搅拌, 自然冷却至常温后再浸种12~14 h。用清水洗净种子, 在28~30℃下催芽。催芽期间, 每天用15~30℃的温清水淘洗种子1~2次, 一般3~4 d后多数种子即可破口露白。

1.1.3 培育壮苗

1.1.3.1 营养土配制 取前茬没有用过除草剂、没有种植过茄果类蔬菜的田园土7份和充分腐熟的优质圈肥3份, 同时每立方米营养土再加入50%多菌灵可湿性粉和50%福美双可湿性粉剂各100 g、复合肥1~2 kg, 充分混匀配制成营养土。将营养土装入规格为10 cm × 10 cm或9 cm × 9 cm的营养钵中, 等待播种。

1.1.3.2 育苗期 根据茬口安排, 冬暖式大棚栽培育苗时期一般选在7月初到8月中旬。

现小菇蕾后不可再喷水, 要求空气流通, 氧气充足。子实体生长需要散射光, 但光线太弱又不能形成子实体, 因此如果用废旧草帘遮光, 彼此不交盖即可满足子实体生长对光线的需求。

6 采收

采收的原则是采大留小, 也可成簇采收。由于温度高, 菇体发育快, 一般情况下早、晚可各采收1次。采收要及时, 以免菌幕破裂使草菇失去商品价值。采下的菇还会继续发育, 应立即将草菇基部的杂质用小刀剔除。采收时尽量不要松动周围的土层,

以免影响小菇的生长。采收后及时浇水, 进行出菇管理, 可继续采收第二、第三批菇。一般第一批菇产量最高, 约占总产量的70%左右。

7 废料处理

如后茬继续栽培草菇, 栽培废料应及时清理出温室, 丁集镇的农民多采用不同温室轮流种植的方法。栽培废料可作为肥料和土壤改良之用, 直接用翻耕机在室内进行深翻。浸泡稻草的水碱性较高, 一般pH达8~9, 可用废盐酸中和后再排出。

1.1.3.3 苗床管理 播种前给营养钵浇水,不宜过大,以浸透营养土层10~12 cm为度。当催芽的种子有50%以上露白时即可播种,每钵播1~2粒,播后覆土0.6~0.8 cm,并用地膜盖好,以保温保湿。播种后至出苗前,拱棚内苗床温度保持在白天25~30℃,夜间17~20℃;出苗后,及时揭去地膜,白天温度保持20~25℃,夜间17~20℃;定植前,白天温度保持在20~25℃,夜间15~18℃。一般6~7 d苗即可出齐,可视土壤干湿情况适当喷水促进生根,或喷洒普力克600倍液兼防猝倒病、立枯病。此期在设置防虫网的基础上,棚内可用10%吡虫啉2 000倍液+噻嗪酮(扑虱灵)1 500倍液+1.8%阿维菌素3 000倍液喷雾,兼杀蚜虫、蓟马、白粉虱、蚜虫等多种害虫。

1.2 选择合适的砧木品种,培育壮苗

1.2.1 砧木选择

野生性强的托鲁巴姆、托托斯加等作茄子嫁接砧木的效果较好,能增强茄子植株的抗性,有较强的抗低温能力,对茄子黄萎病、枯萎病、青枯病、根结线虫病等多种病害的抗性达95%以上,且生长期长,茄子产量高,品质好。

1.2.2 种子处理

砧木种子一般比接穗提前20 d播种。播前用55~60℃的温水浸种半小时,并不断搅拌,待水温降低后,将种子放入药液(4%赤霉素2 mL对水500 g)中浸泡48 h,捞出后放入清水中揉搓洗净,将种皮表面的一层黏膜搓去,然后将种子放入催芽箱中进行变温处理。白天催芽箱温度控制在33℃左右,保持8~10 h;晚上控制在15℃左右,保持14~16 h。这样反复进行变温处理,7 d左右种子露白,8~10 d后种子发芽率达80%,即可播种育苗。

1.2.3 播种及播后管理

在选好的空地上做苗床,浇水后耨锄,使土地平整,然后均匀撒播种子,并覆盖一层4 mm厚的细土。播种后,苗床上要设置小拱棚,将苗床湿度保持在80%左右。夏季育苗,要设置遮阳网或在棚膜上喷泥浆,以防高温强光。白天温度最高不超过40℃,夜间温度保持在22℃左右。

播种后4~5 d,苗即可出齐,视土壤干湿情况适当喷水促进生根,或喷洒普力克600倍液、30%

苗菌敌可湿性粉剂1 500~2 000倍液、10%施宝灵1 000倍液兼防猝倒病和立枯病。

1.2.4 分苗后的管理

播种后25~30 d即可分苗,根据苗大小选择规格为10 cm×10 cm或9 cm×9 cm的育苗钵,将大小苗分开放置,分别管理。分苗后及时浇1次大水。当苗长到6 cm高时,可对长势旺的幼苗喷施25%助壮素750倍液,以促进茎秆粗壮和花芽分化。根据土壤干湿情况适时浇水,但浇水次数不宜过多,否则易造成幼苗徒长,还会引发根部病害。

此期在设置防虫网的基础上,棚内可用10%吡虫啉2 000倍液+噻嗪酮(扑虱灵)1 500倍液+1.8%阿维菌素3 000倍液喷雾,兼杀蚜虫、蓟马、白粉虱、蚜虫等多种害虫。

1.3 嫁接方法

1.3.1 嫁接前准备

搭设高60 cm、宽1 m的塑料小拱棚,长度根据苗床面积而定;备好遮阴覆盖物,如草苫等;准备嫁接工具,包括干净、锋利的刀片和嫁接夹。嫁接要选在晴天遮阴条件下进行。

1.3.2 操作方法

茄子嫁接有多种方法,如劈接法、靠接法、斜切接法(即贴接法)等,文登市一般采用简单易行的劈接法,具体操作如下:

当砧木具有6~8片真叶,接穗具有5~7片真叶,茎秆半木质化,茎粗3~5 mm时,即可进行劈接。砧木切口距茎面4~5 cm,去掉植株上部,然后在砧木茎中间垂直切入1~1.5 cm深,随后将接穗苗拔出,在半木质化处去掉植株下部,保留2~3片真叶,将茎秆削成楔形,大小与砧木切口相当,随即将接穗插入砧木的切口中,对齐后用嫁接夹固定好,放入提前扣好的塑料小拱棚内。

嫁接完成后,将苗摆在预先建好的苗床内(苗床一般长8 m,宽1.5 m),苗床浇透水,小拱棚上覆盖塑料薄膜,大棚外覆盖草苫,开始进入嫁接后的管理。

1.4 嫁接后的管理

嫁接后7 d的管理是保证嫁接苗成活的关键,一般采用“扩孔”管理法加强对温度、湿度的调控。

第1天:以保湿为主,促进嫁接伤口的愈合,原则上全棚密闭,不进行通风,但棚内气温若超过35℃,

中午时可在小拱棚顶部每隔2 m打一直径为6~8 cm的小孔,防止高温高湿造成“蒸苗”。

第2天:开始通风,防止苗床湿度过大影响嫁接接口的愈合。将小拱棚顶部每个小孔的直径扩大为10~12 cm。

第3天:加大通风,并开始让嫁接苗见弱光。将孔径加大到15~18 cm,同时在早上和晚上揭去棚上的草苫,让嫁接苗见弱光。

第4天:继续加大通风,并延长见光时间。此时嫁接伤口基本愈合,为促进砧木生根,提高嫁接苗的成活率,可将孔径扩大到20 cm,同时适当延长揭去草苫的时间,发现苗子有萎蔫时,再及时将草苫盖上。

第5~6天:撤去棚膜,草苫也只在中午前后高温强光时覆盖,进行炼苗。

第7天:嫁接苗成活,撤去草苫,进入常规管理阶段。

第8天:可喷施1次保护性杀菌剂,以预防病害发生。

嫁接苗10 d左右成活,再过3~5 d即可进行定植。

2 定植

2.1 定植前的准备

2.1.1 整地施肥

深翻耕地25~30 cm,每667 m²施优质鸡粪15 m³、尿素25~30 kg、磷酸二铵30~40 kg、硫酸钾20~30 kg(或复合肥75~100 kg)。将基肥翻入整个耕作层土壤中,随后将地面整平,按茄子品种确定行距,开沟起垄。

2.1.2 棚室消毒

定植前7~10 d,选择连续晴天密闭大棚,每667 m²温室用2~3 kg 硫磺粉+适量锯末进行熏蒸消毒;大棚土壤可用50%多菌灵粉剂2 kg、或50%甲基托布津粉剂2 kg、或氢氧化钙75 kg,掺入干土拌匀后,全棚撒施进行消毒。一般闷棚3~4 d,定植前2 d开窗通风、降温散味。

2.2 定植

采取大小行起垄的定植方式,大行80 cm,小行60 cm,株距40~50 cm。定植于垄顶,保证嫁接接口离垄顶地面的距离不少于3 cm,667 m²定植

1 800~2 000株,浇透水。

3 田间管理

3.1 温度管理

缓苗期,白天25~30℃,夜间15~20℃;开花坐果期,白天22~30℃,夜间15~20℃,凌晨短时最低温度不低于12℃;结果期,白天25~30℃,夜间15~20℃,高于32℃时要及时开天窗通风。

3.2 水肥管理

定植后,外界气温仍然较高,应适时浇水,4 d浇2次大水,确保幼苗成活。土壤见干后,及时划锄松土,保墒促根,同时全棚覆盖地膜。门茄“瞪眼”期开始浇水追肥,每隔15~20 d浇1次水;进入盛果期后,每隔7~10 d浇1次水,隔1水追1次肥,一般每次每667 m²追施尿素10~15 kg或大粪干500~800 kg;盛果中后期每667 m²追施硫酸钾7~10 kg或高氮高钾复合肥20~30 kg,也可叶面喷施地尔金300倍液等,以提高坐果率,加快果实膨大。

3.3 整枝、抹杈、摘叶

一般采用双干整枝法,即在茄子主干长到30 cm左右时,在主干分杈处选留两个生长势一致的枝条作为主枝。整枝的原则是:春节前以主枝结茄为主,春节后以侧枝结茄为主。

茄子定植后,当植株长到50~60 cm高时,结合吊蔓进行打杈。将门茄下面的侧枝全部摘除。对于门茄上面的侧枝,应在长至3 cm左右时摘除,摘除时注意保留0.5 cm长的侧枝根部,不能全部摘除,以免影响后期该部位侧芽的萌发。

对茄采摘时,对茄以下的叶片全部摘除,以上的叶片保留;摘3茄时再将3茄以下的叶片摘除,以上的叶片保留,向上以此类推。当主枝长至180 cm左右、接近吊蔓所用钢丝时摘心。

3.4 保花保果

开花时(花似开非开,呈粉红色时最佳),用25 mg/kg的番茄灵1 kg+50%速克灵可湿性粉剂1 g或20~30 mg/kg的2,4-D加入0.1%的50%速克灵可湿性粉剂点花。一般选择上午10时前或下午3时后,用毛笔将药液涂在花蕾和花柄上,不要碰到枝叶。当天配药当天使用,严禁在中午烈日下点花,勿随意降低和提高药液浓度以及重复点花。

4 病虫害防治

4.1 农业防治

4.1.1 选择抗病品种。

4.1.2 耕作改制, 实行严格的轮作制度。

4.1.3 科学施肥、浇水。增施充分腐熟、经无害化处理的有机肥, 实行配方施肥, 增强茄子的抗病能力。浇水采用膜下暗灌或滴灌, 浇水后及时放风排湿, 降低棚内湿度, 以减轻病害的发生。

4.1.4 清洁田园。收获后, 及时将残株败叶及杂草清理干净, 集中进行无害化处理, 保持田间清洁。

4.2 物理防治

4.2.1 设施防护。建造优型棚式结构, 夏季覆盖防虫网和遮阳网, 以减轻病虫害的发生。

4.2.2 铺设银灰膜驱避蚜虫。

4.2.3 使用黄板诱杀蚜虫、白粉虱和蓟马。

4.3 主要病害的化学防治

4.3.1 灰霉病

用50%速克灵1000倍液、或50%扑海因1000倍液、或50%甲霜灵800倍液、或50%农利灵1000倍液、或2.5%适乐时1000倍液喷雾防治, 每隔7~10 d喷1次, 交替用药, 连喷2~3次。

4.3.2 褐纹病

发病初期用70%代森锰锌500倍液、或75%百菌清600倍液、或64%杀毒矾600倍液、或72.2%普力克800倍液喷雾防治, 每隔7~10 d喷1次, 交替用药, 连喷2~3次。

4.3.3 绵疫病

发病初期用40%乙磷铝300倍液、或75%百菌

清600倍液、或70%代森锰锌500倍液喷雾防治, 每隔7~10 d喷1次, 连喷2~3次。

4.3.4 病毒病

发病前用1.5%植病灵1000倍液喷雾防治, 每隔7~10 d喷1次, 连喷2~3次。

4.3.5 白粉病

发病初期用20%粉锈宁乳油1500倍液、或10%世高1500倍液、或75%百菌清可湿性粉剂600倍液喷雾防治, 每隔7~10 d喷1次, 交替用药, 连喷2~3次。

4.4 主要虫害的化学防治

4.4.1 红蜘蛛和茶黄螨

用73%克螨特乳油2000倍液、或15%哒螨灵2500倍液、或1.8%阿维菌素3000倍液喷雾防治。

4.4.2 蚜虫

用2.5%天王星乳油2500倍液喷雾防治。

4.4.3 白粉虱

用25%阿克泰2500倍液或25%扑虱灵2500倍液喷雾防治。

4.5 不允许使用的剧毒、高毒农药

甲胺磷(methamidophos), 甲基对硫磷(parathion-methyl), 对硫磷(parathion), 久效磷(monocrotophos), 磷胺(phosphamidon), 甲拌磷(phorate), 甲基异柳磷(isofenphos-methyl), 特丁硫磷(terbufos), 甲基硫环磷(phosfolan-methyl), 治螟磷(sulfotep), 内吸磷(demeton), 克百威(carbofuran), 涕灭威(aldicarb), 灭线磷(ethoprophos), 硫环磷(phosfolan), 蝇毒磷(coumaphos), 地虫硫磷(fonofos), 氯唑磷(isazofos), 苯线磷(fenamiphos)等。☒

农业部提出加强农产品质量安全监管七项措施

2012年1月7日至8日, 全国农产品质量安全监管工作会议在江苏南京召开。农业部副部长陈晓华在会上说, 2011年全年我国没有发生重大农产品质量安全事件, 农产品质量安全水平稳中有升, 蔬菜、畜禽产品和水产品监测合格率分别为97.4%、99.6%和96.8%, 蔬菜和水产品同比上升0.6%和0.1%, 畜禽产品同比持平, 为农业农村经济持续健康发展提供了重要支撑。陈晓华指出, 2012年各级农业部门要再接再厉, 全力以赴, 一要以治理整顿为抓手, 坚决遏制农产品质量安全突出问题; 二要以监管示范县创建为抓手, 全面推进农产品质量安全监管责任落实; 三要以乡镇监管机构建设为抓手, 全面提升体系队伍监管能力; 四要以检验检测为抓手, 积极推动农产品质量安全监管综合执法; 五要以“三品一标”为抓手, 大力实施农业标准化; 六要以应急能力建设为抓手, 切实做好突发问题的科学处置; 七要以总结推广各地成功经验为抓手, 不断健全完善制度机制。☒